

Topic: RIPARAZIONE CHIRURGICA DELLA PATOLOGIA PELVI-PERINEALE

Autori: BASIRIC FLORIANA (TRAPANI) CAMINATI FILIPPO (PRATO) BARTOLINI NICCOL (FIRENZE) FUCINI CLAUDIO (FIRENZE)

Istituzione: AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CAREGGI (FIRENZE)
CHIRURGIA GENERALE E D'URGENZA 3 F.F. PROF. CLAUDIO FUCINI

Relatore: CAMINATI FILIPPO (PRATO)

E-Mail Relatore: phil.fc@libero.it

Titolo Comunicazione:

ANOPLASTICA CON INNESTO LIBERO DI CUTE PREPUZIALE

INTRODUZIONE

L'utilizzo di un innesto libero di cute prepuziale nella ricostruzione del canale anale fu introdotta da N.V. Freeman nel 1984 ed utilizzata nel trattamento del prolasso mucoso in pazienti pediatrici. Gli autori descrivono, per la prima volta, la tecnica di anoplastica con utilizzo di innesto libero di cute prepuziale in pazienti adulti già sottoposti ad interventi chirurgici demolitivi della regione anale.

METODI

La tecnica di anoplastica con innesto libero di cute prepuziale consiste nel dispiegamento dei due foglietti costitutivi del prepuzio, nell'adesione del foglietto mucoso alla parte interna del neo-canale anale e nell'anastomosi dell'estremità prossimale alla mucosa colica e di quella distale alla cute perineale. Tale metodica chirurgica è stata utilizzata in 2 pazienti rispettivamente di 58 e 44 anni. Il primo paziente, originariamente affetto da malattia di Verneuil perineale plurirecidiva e a carattere destruente, presentò una stenosi cicatriziale dell'anastomosi colo-cutanea fra il colon prossimale e la cute del perineo ricostruito con lembo peduncolato mio-cutaneo di muscolo gracile; il secondo paziente, trattato per carcinoma anale con amputazione addomino-perineale e ricostruzione totale della regione ano-rettale con graciloplastica dinamica, presentò una serrata stenosi della colostomia perineale dovuta a colite ischemica del colon trasposto in perineo.

RISULTATI

L'innesto libero di cute prepuziale, in entrambi i casi, ha attecchito perfettamente con un soddisfacente recupero morfologico e funzionale del canale anale.

CONCLUSIONI

La tecnica di anoplastica con innesto libero di cute prepuziale appare offrire, in casi selezionati, risultati soddisfacenti.