

VALUTAZIONE RETROSPETTIVA DEI SINTOMI E DEI DISTURBI SESSUALI DOPO PROSTATECTOMIA RADICALE E RADIOTERAPIA MEDIANTE L'UCLA-PCI

M. Gacci, G. Giubilei, N. Mondaini, A. Minervini, M. Carini

Clinica Urologica I, Università di Firenze, Firenze

INTRODUZIONE

La preservazione di una soddisfacente attività sessuale dopo trattamento radicale di carcinoma prostatico rappresenta oggi un obiettivo importante.

Scopo del nostro studio è valutare gli items sessuali (SF: sexual function; SB: sexual bother) dell'UCLA-PCI (University of California, Prostate Cancer Index) in pazienti trattati con prostatectomia radicale o radioterapia esterna presso lo stesso centro.

MATERIALI E METODI

595 affetti da adenocarcinoma prostatico sono stati inclusi nello studio: 394 sottoposti a prostatectomia radicale e 201 a radioterapia esterna.

Tutti i pazienti hanno compilato due questionari di qualità di vita: uno generico (RAND SF-36) ed uno cancro specifico (UCLA-PCI).

RISULTATI

I risultati sono riportati nella tabella sottostante:

	UCLA-PCI						SF-36								
RRP	UF	BF	SF	UB	BB	SB	PF	SF	BP	V	MH	HT	GH	RP	RE
SF	0,124 §	0,125 §	1	0,146 §	0,049	-0,026	0,029	0,029	0,151	0,155	0,082	0,051	0,035	0,137	0,125
SB	0,222 +	0,237 +	-0,026	0,224 +	0,334 +	1	0,208 §	0,229 §	0,111	-0,058	-0,055	0,064	0,000	0,074	0,071

	UCLA-PCI						SF-36								
EBR	UF	BF	SF	UB	BB	SB	PF	SF	BP	V	MH	HT	GH	RP	RE
SF	0,126	0,207 §	1	0,149 §	0,236 §	0,386 +	0,329 §	0,130	-0,800	0,467 §	0,333 §	0,134	0,223	0,130	0,079
SB	0,119	0,125	0,386 +	0,132	0,163 §	1	0,264	0,153	-0,201	0,274	0,191	-0,201	0,104	0,194	0,084

CONCLUSIONI

I sintomi e i disturbi sessuali correlano in modo più significativo con i sintomi urinari ed intestinali del gruppo trattato con prostatectomie radicali e con i disturbi urinari ed intestinali nel gruppo trattato con radioterapia. La limitazione dell'attività fisica (PF) è significativamente correlata con i disturbi sessuali post prostatectomia e con i sintomi sessuali post radioterapia.